



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 01-02-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-02-01 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-02-02	2022-02-03	2022-02-04	2022-02-05	2022-02-06
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	33.0	32.0	31.0	30.0	30.0
Tmin (°C)	20.0	19.0	18.0	17.0	18.0
RH I (%)	90	90	92	92	93
RH II (%)	60	62	65	68	65
Wind Speed (kmph)	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0
Wind Direction (Degree)	43	109	87	43	48
cloud cover (Octa)	0	0	0	1	1

Weather Summary/Alert:

- फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. ● फुडल्या ४८ तास किमान तापमानात मोटें बदल दिसपा ना आनी त्याउपरांत २ दिसा सुमार २°C पर्यंत सकयल येवपाक शकता. ● कमाल आनी किमान तापमान ३२°C आनी १९°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. आठवडो १ (२८ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण व्हडलें अपूर्ण आसपाची दाट शक्यता आसा. ● कमाल तापमान सामान्य वयर आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (०४ फेब्रुवारी ते १० फेब्रुवारी) ● जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण अपूर्ण सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा ● कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा ● किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

- दमटसाण खातीर शोषक कीटकांचे प्रभावा आसपाक शकता त्याखातिर शेतकऱ्यांनी शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा

SMS Advisory:

- पशुधनाखातीर पेस्टे-डेस-पेटायटिस रुमिन्ट्स (पीपीआर), बेबेसिओसिस आनी स्वाइन फिव्हराचो धोको चड असपाची आदिंच चत्राय दिल्या. त्याखातीर शेतकऱ्यांक योग्य नियंत्रण उपाययोजन करपाचो सल्लो दिल्लो वता.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
------	------------------------

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• खताचो दुसरो डोस (युरिया – ५४ किलो/हेक्टर) कसप उपरांत दिवपाक जाता. • भातशेतातले उदकाची पातळी राखप. • शेतकऱ्यांनी तण व्यवस्थापन पद्धत आपणावपाची सूचना दिल्ली आसा
GROUNDNUT	• शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. • १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात • ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	• काजू झाडाचेर “टी मोसकितो बग” हल्लो करू शकता त्याखातीर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लो दिलो जाता. • फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातीर १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	• फुलांच्या वेळी (४०- ४५ डीएएस) २% डीएपी (२०० ग्रॅम १० लिटर उदकान विरगळलेले) सह पालवी आचरण करपाक शकता त्याखातीर उत्पादनात २० ते ३५ % सार्थक वाड जाता • शेतकऱ्यांक तण काडप आनी जमीन तयार करप अशी सुचोवणी आसा. • ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. • ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. • पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	• शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा • थ्रिप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातीर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव – कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात. • ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात
WATER MELON	• शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा • नियमीत मध्यंतरीत शिंपणी करात. • हळदुळे चिकट सांपळो लायात. • आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप.
MANGO	• आंब्याभितर पावडरमिड्यू, अँथ्रॅकनोज, काजळी आनी हॉपर्सचा प्रभावा आसपाक शकता • ०.३ मिली इमिडाक्लोप्रिड प्रति लिटर उदकांत २ ग्रॅम वेटेबल सल्फर आनी फवारणीची शिफारस केल्ली आसा. • ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता
ARECANUT	• फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातीर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. • जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप • ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप • पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप
COCONUT	• फुडल्या ५ दिसा हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातीर, नाल्लाच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. • माइट्सच्या नियंत्रणाखातीर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
GOAT	• पशुधनाखातीर पेस्टे-डेस-पेटायटिस रुमिनांट्स (पीपीआर), बेबेसिओसिस आनी स्वाइन फिव्हराचो धोको, फेब्रुवारी २०२२ आंत उत्तर गोंयात चड असपाची आदिंच चत्राय दिल्या. • दुकरांच्या शेड आनी बोकड्यांचे मुळांत साफसफाई आनी जंतुनाश करप गरजेचें

