



Agromet Advisory Bulletin

Date : 02-05-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-05-02 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-05-03	2022-05-04	2022-05-05	2022-05-06	2022-05-07
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	34.0	35.0	35.0	35.0	34.0
Tmin (°C)	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0
RH I (%)	90	91	82	90	85
RH II (%)	42	38	41	39	44
Wind Speed (kmph)	10.6	10.6	11.7	11.1	12.1
Wind Direction (Degree)	297	292	289	292	292
cloud cover (Octa)	2	1	3	3	6

Weather Summary/Alert:

• 2 मे ते 6 मे मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा • कमाल आनी किमान तापमान 35°C आनी 27°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (29 अप्रैल ते 5 मे) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा° आठवडो 2 (6 मे ते 12 मे) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब कम आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

• 2 मे ते 6 मे मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर पिकांचे सिंचन चालू ठेवता चालू दवरपाक जाता

SMS Advisory:

• नारळ मध्ये माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• 2 मे ते 6 मे २०२२, मेरेन मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता त्याखातिर शेतकान्यानी परिपक्व जाल्ल्या रबी भात कापणी करपाची सल्लो दिलोवता
GROUNDNUT	• 2 मे ते 6 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता त्याखातिर शेतकान्यानी परिपक्व जाल्ल्या भिकणाचे कापणी करपाची सल्लो दिलोवता

Crop	Crop Specific Advisory
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> • 2 मे ते 6 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण पिकांचे सिंचन चालू ठेवता • कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून टी मॉस्क्वीटो बग नियंत्रणाचे उपाय करा • काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काढून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वैबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> • 2 मे ते 6 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण पिकांचे सिंचन चालू ठेवता • सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात • “नुवान” रसायन बरोबर मिथायलंयुजेनॉल (०.१% म्हणजे ०.३ मिली) पॅरा फेरोमोनाचे किमान १० सापळे दरहेक्टर स्थापित करात • आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात • तरुण वनस्पतीकतीं ची एन्थ्रॅकोनोझ जावपाची शक्यता त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी करण्याची शिफारस करपाक आयला
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> • 2 मे ते 6 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण पिकांचे सिंचन चालू ठेवता • रोपवाटिकेत ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरोपायरीफॉस (२ मिली लिटर क्लोरोपायरीफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळून) ज़मीन भिजयात (ड्रेंचिंग) करप गरजेचे • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी • 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> • 2 मे ते 6 मे मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर पिकांचे सिंचन चालू ठेवता चालू दवरपाक जाता

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> • FMD आनी HS रोगांचेर मान्सूनपूर्व लसीकरण सल्लो आसा • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक • उदक दिवचे आनी थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटीं न्हाणोवचें • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आनी ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें • हिरव्या चारीचें प्रमाण वाढोवचे आणि खावपाक घालताना लांब चार बारीक करून घालची

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<p>तापमानात ३०°C च्या अथधक वाढत जाताच, आहार घट कमी जाता म्हणून दीवसाच्या थंड भागात म्हणजे कर्ळा-कर्ळा सध्याकाळी उशीरा फीड दीवपाक येता • पीवपाक थंड (शीत) उदका बरोबर ममश्रण करुन इलेक्ट्रो लाइट्रू आनी विटामिन A, E, C इलेक्ट्रो लाइट मशल्लक राखपाखाततर ठदयात • ‘गरम हवामानात’ जास्त चरबी / तेल आहार अथवा सिंथेटिक अत्यावश्यक अमीनो एमई जास्त प्रमाणात ठदवप गरजेचे • दमट हवामान अर्ल्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्षयाची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा • कचरा जाडी (litter) कमीत कमी २-३ से.मी पयांत कमी करात • सोर उषणता वाढपाक जायना म्हणून पेंढा / गवत / पाढया पेंट्रववारे पुरेसे शडे इन्सुलेटेड करात • कोम्बड्याक धरपाचे आनी तींची तीं वाहतूक करपाची कामा दीवसाच्या थंड भागात करात कोंबकों ड्यांक लर्ी करण वेळापत्रकानुंरा र ठदयात • उटमाचो त्रार् टाळपाखाततर कर्ळा लवकरलर्ी करण करा • संक्रमणची जोखीम जास्त आर्ल्या कारणात वॉटर सैनटायझर्चसचा वापर करा</p>