



Agromet Advisory Bulletin

Date : 06-05-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-05-06 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-05-07	2022-05-08	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-11
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	35.0	35.0	36.0	36.0	35.0
Tmin (°C)	27.0	27.0	27.0	27.0	26.0
RH I (%)	83	85	88	89	85
RH II (%)	45	42	41	40	50
Wind Speed (kmph)	10.5	11.2	12.2	14.0	13.8
Wind Direction (Degree)	292	295	292	292	294
cloud cover (Octa)	2	2	6	8	8

Weather Summary/Alert:

• 6 मे ते 10 मे मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा • कमाल आनी किमान तापमान 35°C आनी 27°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (6 मे ते 12 मे) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब कम आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य ते जास्त आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य ते जास्त आसपाची शक्यता आसा आठवडो 2 (13 मे ते 19 मे) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य ते कम आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य ते कम आसपाची शक्यता आसा° 2 आठवड्यात पाऊस/ मेघगर्जनसह पाऊस पडण्याची शक्यता आसा

General Advisory:

• 6 मे ते 10 मे मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर पिकांचे सिंचन चालू ठेवता चालू दवरपाक जाता

SMS Advisory:

• नवीन फळबागांचे जमीन तयार करपाची सल्लो दिवप

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• 6 मे ते 10 मे २०२२, मेरेन मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता त्याखातिर शेतकाऱ्यानी परिपक्व जाल्ल्या रबी भात कापणी करपाची सल्लो दिवप
GROUNDNUT	• कापणी केलेला भिकणाचे एच डी पी ई बॅगमध्ये दवरप , आर्द्रतारोधक कूडमध्ये

Crop	Crop Specific Advisory
CASHEW	<ul style="list-style-type: none"> 6 मे ते 10 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण पिकांचे सिंचन चालू ठेवता • कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून टी मॉस्कीटो बग नियंत्रणाचे उपाय करा • काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅस काढून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग) • नवीन फळबागांचे जमीन तयार करपाची सल्लो दिवप • सामान्यसाठी 7 x 7 मीटर आणि उच्च घनतेच्या वनस्पत वेवस्थाची 5 x 5 अंतर ठेवण्याची दिवप • लागवडीपूर्वी किमान दहा दिवस आधी खड्डे तयार ठेवावेत

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	<ul style="list-style-type: none"> 6 मे ते 12 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण पिकांचे सिंचन चालू ठेवता • सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात “नुवान” रसायन बरोबर मिथायलंयुजेनॉल (०.१% म्हणजे ०.३ मिली) पॅरा फेरोमोनाचे किमान १० सापळे दरहेक्टर स्थापित करात • आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात • तरुण वनस्पतींकतीं ची एन्थ्रॅकोनोझ जावपाची शक्यता त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बेन्डाझिम फवारणी करपाची शिफारस करपाक आयला • नवीन फळबागांचे जमीन तयार करपाची सल्लो दिवप • गोवा आणि कोकण प्रदेशासाची उच्च घनतेच्या वनस्पत वेवस्थाची, लॅटराइट मातीमध्ये 5 x 5 मीटर अंतर ठेवण्याची सल्लो दिवप • सूर्यप्रकाशानंतर, खड्डे वरची माती, 1 किलो रॉक फॉस्फेट, 1 किलो निंबोळी पेंड, 10-20 किलो शेणखत किंवा कंपोस्टने भरले जातात. खड्डे काठोकाठ भरावे लागतात आणि लागवडीपूर्वी किमान दहा दिवस आधी तयार ठेवावेत
COCONUT	<ul style="list-style-type: none"> 6 मे ते 10 मे २०२२, मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर तरुण पिकांचे सिंचन चालू ठेवता • रोपवाटिकेत ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरोपायरीफॉस (२ मिली लिटर क्लोरोपायरीफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळून) ज़मीन भिजयात (ड्रेंचिंग) करप गरजेचे • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी • 250 ग्रॅम + बारीक वाळू (250 ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते • नवीन फळबागांचे जमीन तयार करता येते • लॅटराइट मातीत खड्ड्याचा आकार १.२ मीटर x १.२ मीटर x १.२ मीटर असू शकतो. • खड्ड्याच्या तळाशी नारळाच्या भुसाचे दोन थर पसरवता येतात • शिफारस केलेले अंतर 7.5 मीटर x 7.5 मीटर आसा
ARECANUT	<ul style="list-style-type: none"> 6 मे ते 10 मे मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा त्याखातिर पिकांचे सिंचन चालू ठेवता चालू दवरपाक जाता • नवीन फळबागांचे जमीन तयार करता येते • लागवडीपूर्वी एक आठवडा आधी खड्डा अर्धा वरच्या मातीने आणि 5-10 किलो शेणखत (शेणखत) ने भरलेला असावा

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> FMD आनी HS रोगांचेर मान्सूनपूर्व लसीकरण सल्लो आसा • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक • उदक दिवचे आनी थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचें • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आनी ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचें • हिरव्या चारीचें प्रमाण वाढोवचे आणि खावपाक घालताना लांब चार बारीक करून घालची

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
---------	---------------------------

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<p>तापमानात ३०°C च्या अथधक वाढत जाताच, आहार घट कमी जाता म्हणून दीवसाच्या थंड भागात म्हणजे कर्ळी-कर्ळी सध्याकाळी उशीरा फीड दीवपाक येता • पीवपाक थंड (शीत) उदका बरोबर ममश्रण करुन इलेक्ट्रो लाइट्रू आनी विटामिन A, E, C इलेक्ट्रो लाइट मशल्लक राखपाखाततर ठदयात • ‘गरम हवामानात’ जास्त चरबी / तेल आहार अथवा सिंथेटिक अत्यावश्यक अमीनो एमर्ड जास्त प्रमाणात ठदवप गरजेचे • दमट हवामान अर्ल्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्षयाची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा • कचरा जाडी (litter) कमीत कमी २-३ से.मी पयांत कमी करात • सोर उषणता वाढपाक जायना म्हणून पेंढा / गवत / पाढया पेंट्रववारे पुरेसे शडे इन्सुलेटेड करात • कोम्बड्याक धरपाचे आनी तींची तीं वाहतूक करपाची कामा दीवसाच्या थंड भागात करात कोंबकों ड्यांक लर्ी करण वेळापत्रकानुंरा र ठदयात • उटमाचो त्रार् टाळपाखाततर कर्ळी लवकरलर्ी करण करा • संक्रमणची जोखीम जास्त आर्ल्या कारणात वॉटर सैनटायझर्चसचा वापर करा</p>