



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa



Agromet Advisory Bulletin

Date : 14-01-2022

NORTH-GO(A) Weather forecast of - issued on :2022-01-14 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-01-15	2022-01-16	2022-01-17	2022-01-18	2022-01-19
Rainfall(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tmax (°C)	29.0	30.0	31.0	32.0	32.0
Tmin (°C)	19.0	20.0	21.0	21.0	21.0
RH I (%)	95	91	89	89	88
RH II (%)	69	68	65	65	63
Wind Speed (kmph)	4.0	4.0	5.0	6.0	6.0
Wind Direction (Degree)	60	59	64	73	60
cloud cover (Octa)	5	4	4	3	1

Weather Summary/Alert:

१५ ते १९ जानेवारी २०२२ मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा. कमाल आनी किमान तापमान ३०°C आनी २०°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा. कमीत कमी २४ वरांत तापमानात कसलोच मोठो बदल दिसून येवूना. ताच्या उपरांत ३-४ दिसांत २-३°C न हळूहळू वाड जाता आठवडो १ (१४ जानेवारी ते २० जानेवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य ते सामान्य वयर आसपाची दाट शक्यता आसा. • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य ते सामान्य सकयल आसपाची शक्यता आसा° आठवडो २ (२० जानेवारी ते २६ जानेवारी) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण सामान्य सकयल आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा रब्बी भाता खातिर आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप

SMS Advisory:

एॅफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता.

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर रब्बी भाताची पुनर्लावणी करपाक जाता. रोपवाटिकेच्या रोवणी वेळार लागवडीपूर्वी २९.२ किलो युरिया, १२० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि १६.८ किलो म्युरिएट ऑफ पोटॅश/एकर हे बेसल डोस म्हणून लावप बेगीन रोपण केल्ल्या शेतांत, शेतकऱ्यांनी तण व्यवस्थापन पद्धत आपणावपाची सूचना दिल्ली आसा.
GROUNDNUT	आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. १०-१५ दिस सोडुन शिंपणी करात तण काडप आनी जमीन तयार करप आवश्यक आसा एॅफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CASHEW	येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, १५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता काजू झाडाचेर “टी मोसकिटो बग” हल्लों करू शकता त्याखातिर काजूच्या बागाकडे लक्ष दोवरात आणि तेका लागून नीमचेकीटनाशक वापरपाचो सल्लों दिलो जाता.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
--------------	--------------------------------

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
COWPEA/ LOBIA	आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप. ७-१० दिस सोडुन शिंपणी करात. ऍफिड्स, थ्रिप्स आनी लीफ मायनर्सच्या नियंत्रणाखातीर स्पिनोसॅड @ ०.२ मिली/लिटर उदकान फवारणी करपाक शकता वा NSKE ५% (निंबोळी बियाणे अर्क) लावपाक शकता. पिवळे चिकट सांपळे शेतांत ह्या शोषक कीटकांच्या बऱ्या निरीक्षणाखातीर दवरपाक जाता
CHILLI	शोषक कीटकांचेर नियंत्रणाचो उपाय करा हळडुळे चिकट सांपळो लायात. आंतरमशागत क्रिया करप आनी शेती तणमुक्त दवरप.
WATER MELON	०७ -१० दिस सोडुन शिंपणी करात थ्रीप्स व्यवस्थापन: पिक वाडपाच्य अवस्थेत थ्रिप्सचो भार दिसून येता. थ्रिप्सचो भार वाटवपाक खातिर इमिडाक्लोप्रिड (वेपारिक नांव - कॉन्फिडोर) @ ०.५ मिली/लिटर उदकान फवारणी करू शकतात
MANGO	येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, ५ वर्साकुन कमी वयाच्या झाडांक १०-१५ दिसांच्या मध्यंतर शिंपणी करपाक शकता फळांची संच आनी फळा वाटवपाक खातिर २% पोर्टेशियम नायट्रेटची फवारणी करपाक सुचोवणी आसा. इमिडाक्लोप्रिडाचो फुवारो घातल्यार (०.३ मिली लीटर उदक)आमे पिड्यार करपी किड्यांचेर नियंत्रण करपाक मदत जातली. वेटेबल सल्फर (२ मिली प्रति लिटर उदकान) ना जाल्यार कार्बेन्डाझिम (१ मिली प्रति लिटर उदकान) फवारणी करू शकतात.
ARECANUT	येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, सुपारिच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. तण आनी बंफुटिल्ले कुडके काडुन फळाची बाग निवळ दवरप. जमिनीतील वलसाण जपून दवरपाक झाडाच्या मुळांत घाल्लें तण उपेग करप ताडाचें झाड रखरखीत वतपासून वाचवप पिकिल्लें काजूची कापणी आनी निरास करप
COCONUT	येता तें ५ दिस खर हवामान खातिर, नाल्लच्या झाडांक ४ दिसांच्या मध्यंतर बेसिन पद्धतीन किंवा ठिबक शिंपणी पद्धतीन प्रत्येक दिसां शिंपणी करपाक शकता. माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @०.००४ % फवारणी करू शकतात. गेंड्याच्या भोंवर नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्या पानांच्या कडुनिंबाची भुकटी @ २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात भरल्ली जावपाक शकता. धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजळीचे साचे भायर पडतात. गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार धवे चिकट सापळे बसोवप

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
------------	------------------------------

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	जानेवारी २०२२ मदीं उत्तर गोयां खातीर बेबेसिओसिसचो अत्यंत भंय घडपाचो पयलींच सुचोवणी आसा. गोरवांच्या गोठ्यांत आनी लागसार ऍकेरिसाइड्सचा फुरसतीत वापरिल्लें जाय आसप. शेतकऱ्यांनी जनावरांचो वैज लागीं वचप जर जनावरांक ताप आनी काँफी रंगाचे मूत दिसले तर